

KYXOMOX 500

Antibiótico - Polvo para uso oral

FORMULA:

1 g de producto contiene:

Amoxicilina (como trihidrato)..... 500 mg*

Excipientes c.s.p 1 g

*(equivalente a 574 mg de Amoxicilina Trihidrato).

DESCRIPCION:

Polvo soluble para administrar en el agua de bebida o en alimento.

PRESCRIPCION:

Este producto está compuesto de un antibiótico de amplio espectro como la Amoxicilina.

Está indicado para combatir afecciones producidas por agentes infecciosos sensibles a la Amoxicilina en el aparato respiratorio, genitourinario y digestivo, y complicaciones bacterianas en afecciones víricas. Indicado para combatir infecciones provocadas por los siguientes microorganismos: Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Salmonella, Escherichia coli y Pasteurella multocida.

DOSIS Y USO:

Por vía oral mezclado con el alimento o con el agua de bebida a razón de 20 mg de materia activa por kg de peso vivo durante 3 a 5 días. Multiplicar la cantidad de peso vivo a tratar por 0,04 para obtener la cantidad (en gramos) de Kyxomox 500 a utilizar. En el caso de medicar el agua de bebida se aconseja renovar el agua cada 8 horas. No guardar para su futuro uso.

Para aves: 0.266 g de Kyxomox 500 / litro de agua / día. 400 g de Kyxomox 500 / tonelada de alimento / día. Para porcinos: 0.70 g de Kyxomox 500 / litro / día. 1.12 kg de Kyxomox 500 / tonelada de alimento / día. Instrucciones: la dosis a administrar debe ser diluida antes de incluirla al volumen total del agua de bebida o del alimento: en 10 L de agua o en 10 Kg de alimento.

PRECAUCIONES:

Evitar la luz solar directa sobre el producto. Consérvese en su envase original en lugar seco y entre 10° y 25° C. Las personas alérgicas al grupo de antibióticos beta-lactámicos no deben entrar en contacto directo con el producto. En caso de contacto directo con el producto lavarse con abundante agua, piel, mucosas u ojos expuestos.

Mantener fuera del alcance de los niños. Los envases abiertos deben ser usados dentro de los 12 meses si es almacenado en lugar seco.

Restricciones de uso:

Período de retiro en aves: 24 horas. En el caso de porcinos retirar la medicación 15 días antes de la faena. No aplicar conjuntamente con Tetraciclinas o Cloranfenicol.

PRESENTACION:

Envases: 400 g, 1kg y 5 kg.



Uso veterinario



COFARVET