

# KYXURIL



## Antiparasitario Interno - Coccidicida - Solución para uso oral

Uso veterinario

### FORMULA:

100 ml de producto contiene:

Diclazuril..... 1,0 g

Vehículo c.s.p.....100 ml



## COFARVET

### DESCRIPCION:

Kyxuril es una solución para uso oral usado para la prevención y tratamiento de las coccidiosis causadas por Eimerias en aves, ovinos, porcinos y conejos.

### PRESCRIPCION:

El diclazuril interrumpe completamente el ciclo vital de los microorganismos coccidiales. Tiene una extraordinaria y potente actividad contra varios estados: ooquiste, esquizonte, merozoíto, macro y micro gametocitos. Interrumpe el ciclo vital del microorganismo en estadios tempranos. Actúa sobre los siguientes microorganismos coccidiales:

Eimeria tenella (ciego de pollos y gallinas), Eimeria mivati (intestino delgado - pollos),

Eimeria necatrix (intestino delgado y ciego de gallinas), Eimeria brunetti (intestino delgado de pollos), Eimeria maxima

intestino delgado de pollos), Eimeria acervulina (intestino delgado de pollos), Eimeria mitis (intestino delgado de pollos),

Eimeria ovina (intestino delgado de ovejas), Eimeria suis (intestino delgado de cerdos), Eimeria stiedae (intestino delgado y ciego de conejos).

Para el tratamiento de: porcinos, aves, conejos y ovinos.

### DOSIS Y USO:

Vía oral diluido en el agua de bebida.

La dosis es de 1 mg/ kg de peso vivo para aves. Suponiendo que el consumo de agua sea entre 120 y 200 ml / kg, se deberían diluir de 500 a 830 ml de producto cada 1000 L de agua de bebida. Esta dosis es estimativa y deberá ajustarse a las variaciones productivas y estacionales en el consumo de agua de cada granja. Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario de la parvada. El tratamiento es continuo durante 48 horas. Corderos: 20 mg/kg/día Conejos: 2 a 4 ppm Cerdos: 5 mg/kg de peso vivo.

### PRECAUCIONES:

Consérvese en su envase original entre 15° C y 25° C, evitando la luz solar directa sobre el producto almacenado.

Mantener fuera del alcance de los niños. No entrar en contacto directo con el producto. No comer ni fumar durante la manipulación del producto o su aplicación.

Usar ropas adecuadas, guantes, protección ocular y respiratoria. Conservar en lugares secos, frescos y al abrigo de la luz solar. A las dosis recomendadas no produce efectos locales ni generales. Preparar sólo la cantidad diaria a consumir.

### Restricciones de uso:

Período de retiro para todas las especies: 5 días.

No usar en gallinas ponedoras en producción de huevos que se destinen al consumo humano.

### PRESENTACION:

Botellas de 250 ml y 1 litro.