

LIVERKYX



Uso veterinario

Complemento Nutricional - Protector hepático - Diurético - Solución para uso oral

FORMULA:

100 ml contiene:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Cloruro de colina..... | 5 g |
| Vitamina B12..... | 1 mg |
| L- Carnitina clorhidrato..... | 5 g |
| D,L – Metionina..... | 1,5 g |
| L-Lisina monoclorhidrato..... | 1 g |
| Sorbitol (E-420)..... | 10 g |
| Manitol (E-421)..... | 6,5 g |
| Cloruro de sodio | 10 g |
| Cloruro de potasio..... | 7,5 g |
| Excipientes c.s.p. | 100 ml |



DESCRIPCIÓN:

LIVERKYX es un compuesto nutricional con propiedades hepatoprotectoras, diuréticas y reguladoras de la energía, presentado en solución oral.

PRESCRIPCIÓN:

Indicado como coadyuvante en los casos de hígado graso, síndrome hemorrágico en aves de postura; esteatosis lipoidea y micotoxicosis en pollos parrilleros; aves enjauladas (sedentarias) y en condiciones de estrés, Picos de alta producción en ponedoras, después de la muda; post tratamiento con coccidiostáticos y otras medicaciones que pueden afectar funcionalmente el hígado y los riñones hígado graso en mamíferos, estados de convalecencia y como estimulante de las producciones y del crecimiento.

DOSIS Y USO:

Para administración oral en agua de bebida o como complemento de pienso completo.

Para todas las especies: 2 ml por kg de alimento completo.

1 ml por litro de agua de bebida.

Gallinas ponedoras: 1 ml/L durante 5 días. Repetir el tratamiento cada 3-4 semanas, empezar en la semana 20-30 (edad).

Pollos de engorde: 1 ml/L de agua de bebida durante 5 días. Repetir el tratamiento cada 2 semanas si es necesario, hasta la remisión total de los síntomas.

Después de tratamientos prolongados con antibióticos y coccidiostáticos, vacunas e intoxicaciones: 1 ml/L de agua de bebida durante 5 días.

Asimismo, en todas las especies puede utilizarse desde el nacimiento hasta el sacrificio.

Solo se debe preparar suficiente agua medicada para cubrir los requerimientos diarios. El agua medicada debe reemplazarse cada 24 horas.

Consulte al médico veterinario para ajustar la dosis de acuerdo con las necesidades del caso a tratar y según el consumo diario del lote.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si ocurre una exposición accidental, lavar con agua corriente y jabón. Use ropa adecuada y protectora cuando administre medicamentos. Lávese las manos y cámbiense de ropa después de la administración. Almacenar en su envase original a temperaturas entre 15°C y 25°C evitando la luz solar directa en el producto almacenado. No arroje envases vacíos en sitios abiertos de botaderos de basura, desecharlos de acuerdo con las reglamentaciones locales. No congelar. Cierre el recipiente fuertemente después de cada uso. Se aconseja preparar solo la cantidad diaria que se consumirá. No use soluciones que excedan las 24 horas desde la preparación. No utilizar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Contraindicaciones: No existen.

Efectos secundarios: No existen.

LIVERKYX no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios en las dosis recomendadas.

Restricciones de uso:

Tiempo de retiro: No precisa.

PRESENTACION:

Botella de 1 litro y bidón 5 litros.



Av. Pedro Goyena 1432, 1°A
Buenos Aires, Argentina.
Tel: 0054 2304261488
Email: info@kyxon.com.ar