

CEBABOL

ANABÓLICO DE ACCIÓN PROLONGADA
SOLUCIÓN INYECTABLE

COMPOSICIÓN:

Cada ml de solución inyectable contiene:

Boldenona undecilenato 50mg

Excipientes c.s.p 1mL

DESCRIPCIÓN:

Anabólico de larga acción en solución oleosa inyectable que ofrece la posibilidad de lograr un incremento y mejora de la masa corporal así como una ganancia de peso óptima.

CEBABOL 50® manifiesta un notable efecto estimulante sobre el metabolismo constructivo y resulta útil en el tratamiento de animales seniles, animales en crecimiento, en la recuperación de animales jóvenes que han sufrido o padecen una enfermedad consuntiva.

CEBABOL 50® es un anabólico de tipo semi-sintético, derivado de la testosterona (producida en el testículo), posee modificaciones a nivel de radicales químicos anexos a la molécula esteroidea, lo cual le imparte propiedades altamente anabólicas y reducida acción androgénica.

MECANISMO DE ACCIÓN (FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA):

Se considera como un anabólico de acción prolongada, con efectos que duran por más de 8 semanas. La absorción prolongada después de la administración parenteral (intramuscular) ocurre con las preparaciones de ácidos grasos de cadena más larga, como los ésteres de decanoato y undecilinato, que necesitan hasta 4 semanas para que ocurra la absorción completa a partir de los sitios de inyección. El tiempo de excreción para los esteroides anabólicos de acción más corta en general es de aproximadamente 10 a 14 días. Favorece la absorción de los nutrientes adquiridos por la dieta o suministrados como suplemento.

INDICACIONES:

CEBABOL 50® está indicado en bovinos, equinos, porcinos y perros en los siguientes casos:

Mayor desarrollo de la estructura ósea y aumento de la masa muscular y peso corporal. Mejor y mayor síntesis de proteínas, retención de minerales, mejora del apetito y de la conversión alimenticia. Procesos anémicos (por estímulo de la eritropoyesis: formación de glóbulos rojos). Como coadyuvante en casos de osteomalacia, osteoporosis, leucopenia.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

En bovinos, equinos y porcinos se aplican 50mg a 100mg de **CEBAOL 50®** por cada 90kg de peso vivo. En la práctica 1mL a 2mL de **CEBABOL 50®** por cada 90kg de peso vivo, vía intramuscular profunda, cada 2 a 4 semanas.

En perros se aplican 2,5mg a 5mg de **CEBABOL 50®** por cada 5 a 10kg de peso vivo. En la práctica 0.5mL por 5 a 10 kg de peso vivo, vía intramuscular profunda, cada 2 a 4 semanas.

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.

No administrar a vacas en producción láctea con destino al consumo humano o industrialización.

La sobredosis puede causar masculinización.



Icofarma



COFARVET